



ワクチン		種類	乳児期									幼児期								学童期／思春期										
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上						
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②					③		(注1)																	
	母子感染予防		①	②					③																					
ロタウイルス	1価	生			①	②	(注2)																							
	5価				①	②	③	(注3)																						
肺炎球菌（PCV15、PCV20）		不活化			①	②	③						④						(注4)											
5種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化			①	②	③						④			7.5歳まで					15歳未満まで使用可能									
3種混合（DPT）		不活化																① (注5)						② 11-12歳 (注6)						
2種混合（DT）		不活化																					①11歳		12歳					
ポリオ（IPV）		不活化																① (注7)												
インフルエンザ菌b型（ヒブ） ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化			①	②	③						④							(注8)										
4種混合（DPT-IPV） ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化			①	②	③						④			7.5歳まで					15歳未満まで使用可能									
BCG		生						①																						
麻疹・風疹混合（MR）		生											① (注10)					② (注9, 10)												
水痘		生											①			②	(注11)													
おたふくかぜ		生											①						② (注12)											
日本脳炎		不活化						生後6か月から接種可能						① ②	③	7.5歳まで				④ 9-12歳										
不活化インフルエンザ		不活化						生後6か月から接種可能						毎年（10、11月などに）① ②						13歳以上①										
経鼻弱毒生インフルエンザ		生													2歳以上～19歳未満に 毎年（10月、11月などに）① 点鼻															
新型コロナ		mRNA													製剤により使用できる年齢が異なる															
		不活化																												
ヒトパピローマウイルス（HPV）	9価	不活化																			(注13)	小6	中1① ② (注14)		中2～高1相当 (注15)					
	2価・4価	不活化																			(注13)	小6	中1 ① ② ③ (注14)		中2～高1相当 (注15)					
ワクチン		種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上						

定期接種の
推奨期間定期接種の
接種可能な期間任意接種の
推奨期間任意接種の
接種可能な期間添付文書には記載されていないが
小児科学会として推奨する期間健康保険での
接種時期